

Verloop hiv-infectie

Hiv tast het [afweersysteem](#) [1] aan. Dit verloopt in 4 fasen. Aids is de laatste fase.

Fase 1: primo- of acute infectie

Het virus dringt in de [CD4-cellen](#) [2] en **vermenigvuldigt** zich.

Na enkele dagen of weken hebben sommigen **griepachtige symptomen**: koorts, huiduitslag, gezwollen lymfeklieren, nachtzweeten, gebrek aan eetlust en gewichtsverlies, vermoeidheid, diarree, misselijkheid...

De **ernst** van de symptomen **varieert**: de ene merkt er niets van, de andere is doodziek.

De virale lading [3] is in deze fase zeer hoog. Daardoor ben je zeer besmettelijk.

Na de **aanmaak van antistoffen** [1] daalt de virale lading sterk en verdwijnen de symptomen.

Fase 2: asymptomatische fase

Je hebt **geen symptomen**.

De duur van deze fase verschilt, van maanden tot jaren, afhankelijk van de agressiviteit van het virus en de sterkte van het afweersysteem.

Het hiv-virus blijft actief en vermenigvuldigt zich.

De virale lading is niet meer zo hoog als tijdens de primo-infectie.

Fase 3: symptomatische fase

Symptomen van de primo-infectie kunnen terugkeren en langer aanhouden. Je kan bijvoorbeeld last krijgen van kwaaltjes, zoals schimmelinfecties in de mond.

De virale lading [1] stijgt en de afweer vermindert geleidelijk.

Fase 4: aidsfase

De meeste CD4-cellen [1] zijn vernietigd. Het afweersysteem kan niet meer vechten tegen ziektes.

Je krijgt **opportunistische infecties** [1].

Uiteindelijk zal je **overlijden**.

Laat je behandelen

Wie tijdig [start met hiv-medicatie](#) [4] krijgt geen aids en heeft dezelfde weerstand als iemand zonder hiv.

Wie tijdens de aidsfase met medicatie start, moet langer wachten voor de weerstand is hersteld. Geleidelijk aan wordt het afweersysteem sterker.

Bron-URL: <https://www.levenmethiv.be/medisch/hiv-infectie/verloop-hiv-infectie>

Sensoa Positief is er voor iedereen die geraakt is door hiv. Voor meer info surf naar www.levenmethiv.be, mail positief@sensoa.be of bel 078-151.100.